

10 EFFETS SECONDAIRES

fréquemment rencontrés sous
ANTIDÉPRESSEURS

SEROPRAM®
Citalopram

SEROPLEX®
Escitalopram

PROZAC®
Fluoxétine

FLOXYFRAL®
Fluvoxamine

DEROXAT®
Paroxétine

ZOLOFT®
Sertraline

EFFEXOR®
Venlafaxine

CYMBALTA®
Duloxétine

IXEL®
Milnacipran

ATHYMIL®
Miansérine

NORSET®
Mirtazapine

STABLON®
Tianeptine

ZYBAN®
Bupropion

ETC.

Nausées, vomissements

Effet généralement transitoire.
Éviter la prise du médicament à jeun.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Maux de tête

Effet généralement transitoire.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou une prescription d'antalgique mineur (ex. paracétamol).

Diarrhée, transpiration

Boire suffisamment d'eau.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Constipation, bouche sèche

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose, un changement de médicament ou la prescription d'un médicament laxatif.

Fatigue, somnolence

Éviter la conduite dans la mesure du possible.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Nervosité, insomnie

Éviter la prise du médicament le soir.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de motivation, émoussement émotionnel

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Mouvements anormaux, sensation d'inconfort

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Baisse de libido

Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.

Prise de poids

Marcher, faire de l'exercice, manger beaucoup de fruits crus et de légumes, boire beaucoup d'eau notamment le matin à jeun.
Négocier une diminution de dose ou un changement de médicament.